


# El Hospital de La Ribera utiliza una novedosa técnica quirúrgica para corregir el descenso de los órganos genitales femeninos

## REDACCIÓN

El Hospital Universitario de La Ribera utiliza la colposuspensión al promontorio, la técnica más avanzada de intervención quirúrgica en casos de descenso de los órganos genitales femeninos (prolapso genital).

El prolapso genital es el desprendimiento o deslizamiento de los órganos pélvicos (útero, vagina, vejiga urinaria, uretra o recto) desde su posición normal, y a través de la vagina, en dirección a la vulva (órganos genitales externos de la mujer). Ello es consecuencia de la debilidad de los músculos y los ligamentos que sostienen estos órganos, que forman el suelo pélvico, debido al envejecimiento natural de la mujer o a la agresión que para dicho suelo pélvico presentan los partos múltiples o complejos.

Se calcula que aproximada-



*El jefe del Servicio de Ginecología, Dr. Fernando Naranjo.*

mente el 20% de las mujeres que han llegado a la menopausia, pueden tener un problema de prolapso genital en mayor o menor medida. Los principales síntomas que tiene una mujer que sufre este proble-

ma de salud es la aparición de un bulto en la zona genital, la sensación de peso en el bajo vientre y la incontinencia de orina, gases y/o heces.

Frente a la técnica tradicional de corrección quirúrgica del

prolapso, en la que se sujetan mediante suturas los órganos caídos de la mujer, la colocación de mallas de polipropileno, ya sea por vía vaginal, o mediante laparoscopia, mejora los resultados estéticos y los resultados a largo plazo, disminuyendo el riesgo de posibles recaídas.

El hospital coloca esta malla mediante cirugía laparoscópica por vía abdominal, de manera que el cirujano puede acceder a los órganos pélvicos de la paciente a través de su ombligo y, ayudándose de una pequeña cámara (laparoscopia), recoge los órganos prolapsados de la paciente con la malla, que fija a su promontorio (columna vertebral).

La fijación de la malla por laparoscopia es una técnica menos invasiva para la paciente que la cirugía abierta, lo que

acelera su recuperación y evita complicaciones posteriores. Para llevar a cabo este tipo de intervención, se utiliza anestesia general y la mujer intervenida suele quedar ingresada entre 48-72 horas.

Según ha destacado el jefe del Servicio de Ginecología, Dr. Fernando Naranjo, "esta técnica suele aplicarse en mujeres jóvenes y en aquellas en las que han fracasado otras opciones quirúrgicas".

Según el Dr. Naranjo, "somos uno de los pocos centros hospitalarios de la Comunitat que realiza esta técnica compleja, que requiere disponer de personal experimentado en este campo y de la habilidad de un cirujano con experiencia en laparoscopia".

**Para más información: *Infolaribera: 962457001 o infolaribera@hospital-ribera.com.***